

Radiologie Essen Borbeck

www.plajer.de praxis@plajer.de

Marktstr. 12, 45355 Essen Tel: 0201/8339303 oder 0201/8675160

Verhalten vor einer Computertomographie (CT-Untersuchung):

Die Untersuchung dauert in der Regel nur kurze Zeit. Gegebenenfalls müssen Sie während der Untersuchung für kurze Zeit die Luft anhalten.

Bei Kleinkindern und Jugendlichen stellen wir strengere Anforderungen an die Gründe der Untersuchung (Indikation zur Anwendung von Röntgenstrahlen). Wir bitten Sie, dieses bereits bei der Terminabsprache zu berücksichtigen und uns anzusprechen.

Schwangere Frauen werden von uns in aller Regel nicht mittels CT (unter Anwendung von Röntgenstrahlen) untersucht. Sprechen Sie uns bitte an, falls eine Ausnahme bei Ihnen erforderlich sein sollte, oder über alternative Untersuchungen.

Sollten Sie Zucker- oder Schilddrüsenmedikamente einnehmen, müssen diese bei der Terminvergabe angegeben werden.

Bei einer Untersuchung des Schädels, des Brustkorbes, Lunge/ Herz (Thorax) oder des Bauches (Abdomen) bekommen Sie in den meisten Fällen ein **jodhaltiges Kontrastmittel** verabreicht. Als Vorsichtsmaßnahme dürfen Sie 6 Std. vor der Untersuchung keine Nahrung oder Flüssigkeit zu sich nehmen. Wir empfehlen, anschließend ausreichend Flüssigkeit zu trinken.

Zur Untersuchung mit Kontrastmittel benötigen wir Ihren aktuellen Kreatinin-Wert (Nierenausscheidungswert), dieser sollte nicht älter als 6 Monate sein.

Wenn Sie ein **Metformin**haltiges Medikament einnehmen, darf dieses 2 Tage vor und 2 Tage nach der Untersuchung nicht eingenommen werden!

Vor einer **Schmerztherapie** und einer **CT-Untersuchung des Herzens** sollten Sie mindestens 24 Stunden vorher auf Kaffee/ Tee/ Cola verzichten.

Nach einer **Schmerztherapie** bleiben Sie noch ca. 15-30 min. bei uns zur Beobachtung in der Praxis.

Sofern Sie Voruntersuchungen oder Krankenhausberichte etc. besitzen, die mit der aktuellen Untersuchung im Zusammenhang stehen, bringen Sie diese bitte mit.

Am Untersuchungstag nehmen Sie bitte wie gewohnt Ihre Herz- und/oder Blutdruckmedikamente mit etwas Flüssigkeit ein.